

FICHE RECOMMANDATIONS PRELEVEMENTS VAGINAUX



Laboratoire de Biologie Médicale Tél : 05.65.55.26.20

Conditions de prélèvement, matériel*

◆ Prélèvement chez la femme pubère

absence d'antibiothérapie, hors période des règles

- Spéculum (sauf si grossesse)
- 1 écouvillon standard avec milieu de transport*

Recherches particulières sur prescription explicite :

*Chlamydia trachomatis**

*Mycoplasma genitalium**

◆ Prélèvement chez la fillette ou la jeune fille vierge

absence d'antibiothérapie,

- 1 écouvillon standard avec milieu de transport*

◆ Prélèvement chez la femme âgée et/ou grabataire

absence d'antibiothérapie

- 1 écouvillon standard avec milieu de transport*

*Matériel et conditions d'acheminement :

se reporter au document en lien sur le guide de prélèvement 201-ENR-PRE-PG « Matériel à utiliser pour le prélèvement en vue du diagnostic microbiologique d'infection génitale »

Recommandations en vue d'un auto-prélèvement vaginal : se reporter au document 203-ENR-PRE-PV

Prélèvement

◆ Prélèvement chez la femme pubère

- Poser un spéculum (sauf femme enceinte)
- Prélever au niveau des lésions éventuelles ou des leucorrhées anormales (sauf pour recherche de Chlamydiae par biologie moléculaire)
- En l'absence de lésions, balayer avec l'écouvillon l'ensemble de la cavité vaginale
- Placer l'écouvillon dans le milieu de transport
- Pour la recherche ciblée de streptocoque B, le prélèvement doit être fait en balayant l'ensemble de la cavité vaginale (exocol, culs de sac vaginaux) incluant absolument un balayage des parois vaginales de la moitié inférieure du vagin jusqu'au vestibule (orifice vulvaire)
- Pour la recherche de *Chlamydia* par biologie moléculaire : éviter de prélever au niveau des leucorrhées et ne pas utiliser de lubrifiant pour la pose de spéculum
- Pour un prélèvement d'endocol (indiqué en cas de cervicite) : après pose du spéculum et exposition du col, nettoyage soigneux à l'aide d'une compresse imbibée d'un antiseptique puis rinçage avec une compresse imbibée d'eau physiologique avant de prélever à l'écouvillon.

◆ Prélèvement chez la fillette ou la jeune fille vierge

- Ecarter les lèvres délicatement
- Ecouvillonner l'entrée du vagin sans traumatisme avec l'écouvillon et le placer dans le milieu de transport. En présence d'une vulvite, penser à rechercher la présence d'oxyure au niveau de la marge anale par un scotch test

◆ Prélèvement chez la femme âgée et/ou grabataire

- Lavage soigné à l'eau savonneuse de tout le périnée
- Spéculum facultatif
- Ecouvillonner au niveau du vagin avec l'écouvillon et le placer dans le milieu de transport