Laboratoire de Biologie Médicale

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES EN VUE DE LA REALISATION D'UN ECBU
(ECBU = Examen Cytobactériologique Urinaire)

Ces renseignements sont indispensables à l'interprétation des résultats et à la prise de décision de réaliser ou non un antibiogramme

NOM
Prénom
Age

(coller étiquette patient)

Date et heure du recueil d'urines : ……..

Date et heure réception laboratoire :……

Recueil des urines par voie naturelle en milieu de jet ☐ OUI ☐ NON

Si **oui**, dernière miction depuis plus de 2 heures : ☐ OUI ☐ NON

Si **non**, autre mode de recueil :……..
Si urinocol, temps de pose supérieur à 30 minutes : ☐ OUI ☐ NON

Traitement antibiotique en cours ou récent ☐ OUI ☐ NON

Si en cours, depuis le : ……..
Si récent, arrêté le :……
Nom du médicament :……

Présence de fièvre ☐ OUI ☐ NON

Signes urinaires (douleurs lombaire, brûlures en urinant…) ☐ OUI ☐ NON

Grossesse ☐ OUI ☐ NON

ECBU prescrit avant une intervention chirurgicale (mise en place d'une prothèse ostéo-articulaire, endovasculaire ou valvulaire cardiaque)
☐ OUI ☐ NON

ECBU prescrit avant une chirurgie urologique, prostatique, une biopsie prostatique un bilan uro-dynamique
☐ OUI ☐ NON

Terrain diabétique ou immunodéprimé ☐ OUI ☐ NON

Sondage urinaire dans les 10 jours précédents ☐ OUI ☐ NON

Ce document ne doit être ni photocopié, ni imprimé sans l'autorisation du responsable Assurance Qualité

FICHE RENSEIGNEMENTS CLINIQUES ET MODALITES DE RECUEIL POUR ECBU

ECBU = examen cytobactériologique des urines : permet le diagnostic d'une infection urinaire par la mise en évidence dans les urines de leucocytes et de la (ou les) bactérie(s) en cause.
Le délai de rendu des résultats est de 1 jour s'il est négatif, 3 à 4 jours s'il est positif.
Un traitement antibiotique gêne la réalisation de l'examen et doit être impérativement signalé au recto de cette feuille.

ou

Le prélèvement s'effectue le matin au lever ou après 2 heures de rétention urinaire au minimum.

1

Se laver les mains au savon
Se sécher avec un linge propre ou essuie-main à usage unique type sopalin

Faire un lavage de la région vulvaire à l'aide de la lingette antiseptique* fournie (mouvement d'avant en arrière).
Ecarter les lèvres pour une désinfection efficace
En cas de pertes vaginales, le recueil se fera après pose d'une protection vaginale type tampon ou compresse.

Découvrir entièrement le gland.
Faire une toilette à l'aide de la lingette antiseptique fournie



2 Ouvrir le pot.
Poser le couvercle avec la canule vers le haut sans toucher celle ci







3 Eliminer le premier jet d'urine dans les toilettes puis recueillir l'urine dans le pot (sans toucher le bord supérieur)
Idéalement, ne pas interrompre le jet d'urines entre les toilettes et le pot.
Chez la femme, écarter les lèvres pendant le recueil des urines pour éviter la contamination des urines par des sécrétions vaginales résiduelles

4 Refermer le pot avec le couvercle
Ne pas forcer
Respecter le pas de vis

Eliminer la lingette dans une poubelle

Ne pas enlever l'opercule blanc du couvercle

5 Dans le cas d'un prélèvement à domicile, identifier le pot avec le nom, prénom, date et heure du recueil, et le porter au laboratoire dans les 2 heures sinon conserver au réfrigérateur (maximum 12 heures)

* En cas d'allergie au chlorure de benzalkonium (antiseptique), utiliser un savon doux ou du Dakin.

Ce document ne doit être ni photocopié, ni imprimé sans l'autorisation du responsable Assurance Qualité