


FICHE RECOMMANDATIONS POUR PRELEVEMENT NASOPHARYNGE

Prélèvement naso-pharyngé = NASO-PHARYNX




Indications :

- Recherche de grippe par PCR
- Recherche de coqueluche par PCR

Matériel :

- Ecouvillons avec milieux de transport spécifiques (voir fiches analyse)
- Gants, masque



Réalisation du prélèvement

Mettre des gants à usage unique et porter un masque.

Si mucosités, faire moucher le patient.

Faire asseoir le patient, la tête droite.

Soulever la pointe du nez de manière à offrir la vision de la fosse nasale en enfilade au niveau de son plancher.

Saisir entre deux doigts l'écouvillon par le corps (et non par le bouchon plastique).

Introduire l'écouvillon dans la narine perpendiculairement au plan de la face (et non parallèlement à l'arête nasale) en longeant le plancher de la fosse nasale.

Enfoncer l'écouvillon jusqu'au contact de la paroi rhino-pharyngée. Une résistance doit être nettement perçue.

Faire rouler l'écouvillon entre les doigts pour prélever l'échantillon de mucus.

Retirer l'écouvillon dans l'axe et prendre garde à ne pas toucher les parois et l'orifice narinaire.

Casser l'écouvillon dans le milieu de transport, identifier le prélèvement et acheminer au laboratoire.

NEJM Procedure: Collection of Nasopharyngeal Specimens with the Swab Technique

Recommandations CNR Coqueluche <https://www.youtube.com/watch?v=DBrxP7vHM3Y&feature=youtu.be>

