

FICHE RECOMMANDATIONS POUR PRELEVEMENT NASOPHARYNGE


Prélèvement naso-pharyngé = NASO-PHARYNX

Indications :

- Recherche de grippe par PCR
- Recherche de coqueluche par PCR
- Recherche de SARS-CoV-2 par PCR

Matériel :

- Ecouvillons avec milieux de transport spécifiques (voir fiches analyse)
- Equipement de protection individuelle : Gants, masque, lunettes, surblouse, charlotte...



Réalisation du prélèvement

Pour la recherche de coronavirus, voir le document « Prise en charge des prélèvements pour les patients suspects de coronavirus - 423-ENR-PRE-CORO » accessible sur le guide de prélèvement et respecter les consignes d'habillage-déshabillage établies par le service d'hygiène.

Pour les autres prélèvements, porter au minimum des gants et un masque.

- Si mucosités, faire moucher le patient.
- Faire asseoir le patient, la tête droite.
- Soulever la pointe du nez de manière à offrir la vision de la fosse nasale en enfilade au niveau de son plancher.
- Saisir entre deux doigts l'écouvillon par le corps (et non par le bouchon plastique).
- Introduire l'écouvillon dans la narine perpendiculairement au plan de la face (et non parallèlement à l'arête nasale) en longeant le plancher de la fosse nasale.
- Enfoncer l'écouvillon jusqu'au contact de la paroi rhino-pharyngée. Une résistance doit être nettement perçue.
- Faire rouler l'écouvillon entre les doigts pour prélever l'échantillon de mucus.
- Retirer l'écouvillon dans l'axe et prendre garde à ne pas toucher les parois et l'orifice narinaire.
- Casser l'écouvillon dans le milieu de transport.
- Respecter les consignes du document « Prise en charge des prélèvements pour les patients suspects de coronavirus - 423-ENR-PRE-CORO » pour l'identification et l'acheminement du prélèvement.

NEJM Procedure: Collection of Nasopharyngeal Specimens with the Swab Technique

Recommandations CNR Coqueluche <https://www.youtube.com/watch?v=DBrxP7vHM3Y&feature=youtu.be>

